AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL:XXXXXX

PUBLICATION PERIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ET FRANCHE-COMTÉ : COTE-D'OR : SAONE-8-LOIRE : YONNE : NIÈVRE : JURA : DOUBS : HAUTE-SAONE : TERRITOIRE DE BELFORT

60 F.

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CEDEX - Tél. (80) 22.19.38

Regisseur de recettes de la Direction Departementale de l'Agriculture + c c e duon 3405 12 K

Bulletin n° 165 - 11 Juillet 1979

Le bulletin n° 164 du 9 juillet 1979 sur la lutte précoce contre la pyrale du maïs n'a été adressé qu'aux abonnés de l'YONNE.

VIGNE

TORDEUSES DE LA GRAPPE: Dans le Beaujolais, Mâconnais, Jura, le deuxième vol de Cochylis commencé début juillet vient de s'intensifier, mais dans les autres secteurs le second vol d'Eudémis et de Cochylis démarre seulement.

En conséquence :

- un traitement préventif est recommandé à partir du début de la semaine du 16 au 21 juillet dans les régions citées ci-dessus,
 - attendre un nouvel avis pour les autres situations.

Nous rappelons qu'en deuxième génération la lutte préventive est retenue. Elle vise à atteindre les pontes et surtout les larves avant qu'elles aient fait des dégâts sur lesquels peut s'installer la pourriture grise.

Les applications, pour être efficaces, doivent être bien localisées dans la zone des grappes, et leur renouvellement peut être nécessaire en cas de lessivage ou si la rémanence du produit ne couvre pas la période des éclosions (cas fréquent de vol échelonné qui sera précisé en temps utile).

Parmi les nombreuses matières actives autorisées, signalons les dernières autorisations de vente en grammes de matière active par hectolitre :

- chlorpyriphos: 28,5 (Dursban); décaméthrine: 1,75 (Decis);
- fenvalérate : 7,5 (Sumicidin 10); perméthrine : 4 (Ambush, Perthrine)
- étrimphos : 39 (Ekamet) ; cyperméthrine: 3 (Ripcord)

CICADELLES: Le méthomyl (Lannate), le méthidathion (Ultracide), le parathion (nombreuses spécialités) etc... sont également efficaces contre les cicadelles qui ont tendance à se multiplier localement.

MILDIOU - OIDIUM : Le renouvellement de la protection contre le mildiou ne s'impose que dans les situations où des taches sont apparues, dans les vignes grêlées, dans les jeunes plantations.

Ailleurs on profitera du traitement "vers" pour effectuer une nouvelle couverture antioïdium et anti-mildiou. A l'égard du mildiou, cette intervention sera peut-être la dernière
ce qui permet de conseiller un produit à base de cuivre (ou un organo-cuprique).

POURRITURE GRISE: Compte tenu du développement rapide des grappes nous rappelons que la
seconde application spécifique contre le Botrytis est à effectuer avant fermeture de la
grappe, stade prochainement atteint en situations précoces.

ARBRES ET AREUSTES FRUITIEFS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES : Une nouvelle application doit être envisagée au début de la semaine prochaine.

OIDIUM AMERICAIN ET "ANTHRACNOSE" SUR CASSISSIER et GROSEILLIER : Après récolte il est conseillé une dernière application mixte (voir notre bulletin n° 157 du 18 mai 1979).

Le mancozèbe et le manèbe (nombreuses spécialités) sont efficaces contre"l'Anthracnose".

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie Chef de la Circonscription phytosanitaire "Bourgogne et Franche-Comté"

G. VARLET

7102